

ОТ РЕДАКЦИИ



Многоуважаемые коллеги!

Мы рады представить Вам очередной выпуск нашего журнала. В данном номере мы рассматриваем 3 оригинальных исследования.

Вопрос о факторах риска развития несостоятельности колоректального анастомоза остается одним из основных в хирургии рака прямой кишки. С.Ю. Трищенко и соавт. представили анализ собственного опыта выполнения 474 подобных вмешательств. Любопытно, что помимо описанных ранее другими авторами факторов риска, таких как проведение химиолучевой терапии и сахарный диабет, коллеги отметили корреляцию между стадией заболевания и развитием несостоятельности межкишечного анастомоза. Частота повторных операций достигала 15 % у пациентов без превентивной кишечной стомы, что в очередной раз подчеркивает важность осторожного подхода к выбору показаний к проведению одноэтапных хирургических вмешательств у больных раком прямой кишки.

Большой интерес представляет анализ опыта НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина по проведению спасительной лучевой терапии у пациентов с регионарными рецидивами рака простаты. Несмотря на то что такое лечение можно считать очевидным выбором в подобной ситуации (сами авторы называют его «золотым стандартом»), из-за относительной редкости состояния методика остается нестандартизованной, результаты применения изучены недостаточно. Авторы представляют детальное описание процесса проведения лучевой терапии, анализ частоты осложнений и выживаемости на репрезентативной выборке пациентов.

О.А. Розонова и соавт. представили уникальный опыт лечения лейомиосарком тела матки и проанализировали факторы риска с учетом гистологического подтипа опухоли. Подобные исследования в будущем помогут использовать более персонализированные подходы у данной категории пациентов.

Следует также обратить внимание на обзор литературы, посвященный использованию протонной лучевой терапии при раке прямой кишки. Данная технология проведения лечения пока не имеет четко определенной области применения, возможные преимущества остаются предметом дискуссий. Анализ актуальной на данный момент литературы позволяет пролить свет на проблему. Другой малоизученной методикой является использование необратимой электропорации при раке поджелудочной железы. А.Н. Поляков и соавт. не только провели подробное изучение мирового опыта по применению данного метода лечения, но и представили описание клинического применения необратимой электропорации в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Мы надеемся, что представленные публикации будут интересны нашим читателям, и, как всегда, ждем Ваших отзывов и предложений.

**Искренне ваша,
редакционная коллегия**